



| 《目次》 | 1 | |
|-------------------------|----|--|
| ルイヨウショウマ | 2 | |
| ルイヨウボタン | 3 | |
| ルドベキア | 4 | |
| ルドベキア・トリロバ | 5 | |
| ルドベキア・プレーリーサン | | |
| ルドベキア・フレーリーリンルドベキア・マキシマ | | |
| | 7 | |
| ルバーブ | 8 | |
| ルピナス | 9 | |
| ルリギク | 10 | |
| ルリジサ | 11 | |
| ルリソウ | 12 | |
| ルリタマアザミ | 13 | |
| ルリヂシャ | 14 | |
| ルリマツリ | 15 | |
| ルリマツリモドキ | 16 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

【花期 5~6月】



花 葉 2007.5.29戸隠



ルイヨウショウマ 実

2018.9.3信濃

ルイヨウショウマ 類葉升麻〈キンボウゲ科ルイヨウショウマ属〉

深山の林の中に生える多年草。高さ40~70cm。葉は大型、2~3個、2~3回3出複葉、小葉は卵形か卵状披針形、長さ4~10cm、ふちに大小不同の鋭い鋸歯。茎の先に総状花序を出し、白色で柄のある小花を密につける、萼片4個、時に3~5個、花弁状、早落性、花弁4~6個、広いへら形、雄しべ多数、雌しべ1個。果実は液果、黒く熟す。[3][18][33][42]

■名は、葉がショウマ(=サラシナショウマ)に似ているため。[4][18]

| 花撮影月 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 |
|----------|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|---|---|
| ルイヨウショウマ | | | | | | | | | | | | |

【花期 4~7月】



ルイヨウボタン 太い根茎の先から茎は1本出て直立【32】

2003.6.3軽井沢



雄しべ 花弁 萼片・ 苞葉

花 苞葉は3~6個、花時には落ちる【42】

2004.5.15軽井沢



2004.5.15軽井沢




種子 1999.10.16戸隠

ルイヨウボタン 類葉牡丹〈メギ科ルイヨウボタン属〉

深道の株成に生える多年草。高さ40~70cm。葉は互生、2~3回3 出複葉、小葉は卵形~長楕円形、時に2~3裂、全縁。茎先や葉腋 に花字をつくり、黄緑色の花、径7~10mm、萼片6個、花弁状、 花弁6個、小さく、蜜を分泌、雄しべ6個、花弁と薫なり合う、雌 しべ1個。子房の壁はすぐ破れてしまい、胚珠は裸になって種子 に成長、熟せば青い液果のよう、径6mm。[3][18][32][42]

■名は、葉がボタンの葉に似るから。【18】 ■全草無毛で、悪臭がある。【7】

| 花撮影月 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 |
|---------|---|---|-----|----|---|---|---|----|----|----|---|---|
| ルイヨウボタン | | | (((| (0 | | | | | | | | |



ルドベキア・トリロバ

2015.10.17小諸

ルドベキア・トリロバ --- (キク科オオハンゴンソウ属)

北アメリカ原産の二年草または短命の多年草。全体に細い毛。蒿 さ80~150cm。葉は互生、楕円形~卵状楕円形、先は尖る、ふち に疎らな鋸歯または全縁。枝先に頭状花をつける、<mark>径3~5cm</mark>、 舌状花は普通8個、黄色、管状花は半球状、焦げ茶色。[58][80][84]

- ■学名Rdobeccki triloba。【58】
- ■タカオという品種が主に流通している。[80] ■下部の葉には3裂するものがある。[58] ■別名ミツバオオハンゴンソウ。[84]

| 花撮影月 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 |
|------------|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|---|---|
| ルドベキア・トリロバ | | | | | | | | • | | • | | |

【花期 初夏~】



ルドベイア・プレーリーサン

2016.7.3長野

ルドベキア・プレーリーサン ―― 〈キク科ルドベキア属〉

北アメリカ原産の一年草。根元から多数分枝。高さ60cm。花は一重咲き、<mark>径約10cm、花</mark>弁は黄橙色、<mark>花芯は黄緑色</mark>。[78][81]

| 花撮影月 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 |
|---------------|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|---|---|
| ルドベキア・プレーリーサン | | | | | • | | | | | | | |

【花期 7~10月】



ルドベキア・マキシマ

2015.8.10長野


ルドベキア・マキシマ — 〈キク科オオハンゴンソウ属〉

アメリカの南東部から中南部に分布する多年草。高さ0.6~2.7m。 葉は篦形、長さ30~60cm、青緑色あるいは銀灰色。茎頂に黄色 い頭花をつける、径7.5cm程、舌状花は下垂する。花芯は高く立 ち上がり、花の後も残る。[58][86][93]

■学名Rudbeckia maxima。【58】

| 花撮影月 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 |
|------------|---|---|---|---|---|----|---|----|----|----|---|---|
| ルドベキア・マキシマ | | | | | | (0 | | | | | | |


【花期 5~7月】







実 2004.6.17軽井沢町植物園





ルバーブ


ルバーブ Rhubarb 別名ショクヨウダイオウ・マルバダイオウ〈タデ科ダイオウ属〉


シベリア原産。明治初期に渡来。葉柄を食用野菜に栽培する多年草。根茎は肥大。茎は東生、直立、高さ40~60cm。根生葉は心臓形、葉柄は太く、多肉、紅色を帯び、酸味と芳香がある。花茎をのばして円錐花序をつける。花は多数、小さい、緑白色、萼6裂、雄しべ9個、花柱3個。[5][18][58]

■別名ショクヨウダイオウは食用大黄、マルバダイオウは丸葉大黄。【58】■大黄 =タデ科の多年草の数種の総称。【5】■葉柄を煮て、ジャム・ゼリー・ソースな どを作る。【5】■1度春か秋に蒔けば、30年も育つ。株分けも可。【18】

| | 花撮影月 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 |
|------|------|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|---|---|
| ルバーブ | | | | 0 | | | | | | | | | |

【花期 春~夏】







実 2005.7.8軽井沢



ルピナス

2014.5.19小布施



2005.5.15飯山

ルピナス ── 別名ノボリフジ〈マメ科ルビナス属〉

マメ科ルピナス属 (ハウチワマメ属) の植物の総称。 衛北アメリカとヨーロッパに約300種が分布。 花壇などに植える1年草または多年草。 葉は長柄、葉身は普通**掌状複葉**、 小葉5~15個。 <mark>花穂を置</mark>立し、蝶形花をつける、花色は黄・赤・桃・紫・青など。 [5][58]

- ■名は、オオカミ(狼)を意味するラテン語の「Lupus」に由来し、オオカミのように どんな土地でもはびこることから。【58】
- ■ノボリフジ=昇り藤。【58】

| 花撮影月 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 |
|------|---|---|--------|---|---|---|---|----|----|----|---|---|
| ルピナス | | | 9 ((8) | 9 | | | | | | | | |



ストケシア 2015.7.11小諸

ストケシア ― 別名ルリギク〈キク科ストケシア選〉

北アメリカの南西部に分布する多年草。大正時代の初めに渡来。 高さ30~50cm。株は横にやや広がる。葉は笹のような細身の形 をしている。<mark>花茎の先端が枝分かれ</mark>してたくさんの花をつける。 花は径7~8cm、<mark>花弁はヤグルマギクに似て</mark>、細かく分かれる、 花色は青色、紫色、桃色、白色、淡い黄色など。[77][83][93][114]

- 学名Stokesia laevis。【83】
- ■ストケシアの名は、イギリスの植物学者ストークスに因む。【77】 ■別名のルリギクは、花がきれいな瑠璃色をしているので。【114】

| | 花撮影月 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 |
|-------|------|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|---|---|
| ストケシア | | | | | | 0 | | | | | | | |

【花期 5~9月】



花序 葉 2017.8.17白馬五竜



ボリジ 2017.8.17白馬五竜

ボリジ ―― 〈ムラサキ科ボラゴ異〉

地中海沿岸が原産の秋·春まき一年草。全草が細かい毛で覆われる。高さ30~80cm。葉は楕円形、長さ15~20cm、深い緑色、キュウリのような香りがある。花は星形、径2~3cm、澄んだ青色または白色、下向き、雄しべは飛び出す、黒っぽい。[58][83][84]

- ■学名Borago officinaris。【58】 ■別名ルリジサ・ルリヂシャ (瑠璃苣)。【58】【84】
- ■名は、ラテン語のBorra=剛毛(ごうもう)に由来。【84】
- ■古くから使われてきたハーブでサラダなどの食用。種子の油は薬用。【84】

| | 花撮影月 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 |
|-----|------|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|---|---|
| ボリジ | | | | | | | • | | | | | | |

【花期 4~6月】



花 花は濃い藍色、まれに紅紫色[64]

2002.5.22軽井沢町植物園



ルリソウ 根生葉は茎の中央部の葉より小さい[32]

2010.6.7軽井沢町植物園

ルリソウ 瑠璃草 (ムラサキ科ルリソウ属)

山野の未陰に生える多年草。茎は直立、高さ20~35cm、葉とともに細かい毛がある。葉は互生、根生葉には長柄、上部の葉は次第に無柄となる、葉身は倒披針形、長さ7~15cm、全縁。茎の先端に総状花序を出す、普通基部で2つに分かれる、花序は最初渦巻き状、開花とともにのびる、花は径10~15mm、等5深裂、花冠は濃い藍色、上部は5裂、平開、筒は短い。[3][18][32][42][64]

■名は、花の色に基づく。【18】

| | 花撮影月 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 |
|------|------|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|---|---|
| ルリソウ | | | | 0 | 0 | | | | | | | | |

【花期7~8月】



ルリタマアザミ

2010.8.14原村/円内2015.7.21小諸

ルリタマアザミ 瑠璃玉薊 〈キク科〉

東ヨーロッパ~西アジア原産の多年草。

- ●軽井沢町植物園の駐車場脇に咲いていた個体は撮影当時、名札が添えてあった。 マジックで手書きされた「ル」の文字がかすれて「ハ」となっていたものだから このページに着手するまで「ハリタマアザミ(針玉薊)」なのだとほんとうに思い こんでいた。
- ●ルリタマアザミの別名はウラジロヒゴタイだそうな。葉の裏に灰白色の綿毛が生えていることゆえとか。なので、葉裏の綿毛の有無がヒゴタイとの識別判断法らしいと思っていたら2013.9.28に軽井沢町植物園で出会ったヒゴタイの葉裏にも綿毛があった。あらためて師匠を調べたら「(ヒゴタイの)葉の下面は綿毛を密集して純白色にちかい」【32】だって。??。

| 花撮影月 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 |
|---------|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|---|---|
| ルリタマアザミ | | | | | | • | | | | | | |



花序 2017.8.17白馬五竜



ボリジ 2017.8.17白馬五竜

ボリジ ―― 〈ムラサキ科ボラゴ属〉

地中海沿岸が原産の秋・春まき一年草。全草が細かい毛で覆われ る。高さ30~80cm。葉は楕円形、長さ15~20cm、深い緑色、キ ュウリのような香りがある。花は星形、径2~3cm、澄んだ青色 または白色、下向き、雄しべは飛び出す、黒っぽい。[58][83][84]

- ■学名Borago officinaris。【58】■別名ルリジサ・ルリヂシャ (瑠璃苣)。【58】【84】 ■名は、ラテン語のBorra=剛毛 (ごうもう)に由来。【84】 ■古くから使われてきたハーブでサラダなどの食用。種子の油は薬用。【84】

| 花撮影月 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 |
|------|---|---|------------|------------|---|----------|-------------|----|----|----|---|---|
| ボリジ | | | | | | • | | | | | | |
| | | | -510/10/11 | N DOMESTIC | | DOWN THE | 11000000000 | | | | | |

【花期 5~10月】常緑小低木(寒冷地では冬季落葉)



ルリマツリ 葉長3~5cm[84]

2016.8.4馬籠宿



花 花序は短く、花が漏斗状なので、ボール状にまとまる【84】 2016.8.4馬籠宿

ルリマツリ 瑠璃茉莉 〈イソマツ科ルリマツリ属〉

衛アフリカ原産。茎はしなやかな半蔓性。他物に寄りかかるようにして成長する。高さ0.6~2.4m。葉は互生、楕円形~倒卵形、状きさはまちまち、先は丸い、光沢がある。茎頂や葉腋に短い穂状花序を出す。萼は筒状、5裂、腺毛があり粘る、花冠漏斗形、径20mm、先は5裂、平開、筒部は長い。[18][58][77][84]

- ■ルリマツリのルリは花色から。マツリは花姿がマツリカ(ジャスミン)似ているところから。【77】
- ■花色が白ややや濃いブルーのもの、斑入り葉種、矮性品種などがある。[84]

| | 花撮影月 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 |
|-------|------|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|---|---|
| ルリマツリ | | | | | | | 0 | | | | | | |

【花期 6~10月】



地下茎をのばして広がるため、 グランドカバーに利用される[58] 2015.11.1長野



ルリマツリモドキ 冬は地上部が枯れ、地下茎状態で越冬[77] 2015.10.7小諸

ルリマツリモドキ 瑠璃茉莉擬き〈イソマツ科ルリマツリモドキ属〉

中国西部原産。低木のものと多年草のものがある。地下茎をのばして横に広がり、細長い茎が四方八方に勢いよくのび、匍匐。高さ20~60cm。葉は互生、楕円形~倒卵形、長さ4~6cm、秋には赤褐色に紅葉。茎質や葉腋に短く詰まった穂状花序をつくる。花は漏斗形、瑠璃色、先端は平開、5裂、径2cm。[58][77][84]

■属名のケラトスティグマ(Ceratostigma)はギリシア語のケラス(keras=角)とスティグマ(stigma=柱頭)からなり、花の一部である柱頭という器官の形に由来する。【77】

| 花撮影月 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 |
|----------|---|---|---|---|---|---|---|-----|----|----|---|---|
| ルリマツリモドキ | | | | | | | | 0 (|) | | | |